

**ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНА -
ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРИЧИН**

ИНФАРКТА МИОКАРДА

**НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА - НЕ ВЫШЕ 5 ммоль/л.**

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ИНФАРКТА:



АРТЕРИАЛЬНАЯ
ГИПЕРТОНИЯ



ОЖИРЕНИЕ



ВОЗРАСТ



КУРЕНИЕ



АЛКОГОЛЬ



САХАРНЫЙ
ДИАБЕТ



НЕПРАВИЛЬНОЕ
ПИТАНИЕ



МАЛОПОДВИЖНЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ



ПРОФИЛАКТИКА ИНФАРКТА МИОКАРДА:

- ежегодный профилактический осмотр или диспансеризация;
- своевременная адекватная терапия хронических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, атеросклероз и др.;
- занятия физкультурой или ежедневные получасовые прогулки в умеренном темпе;
- ограничение потребления соли до 5 грамм в день, сахара – не более 30 грамм;
- ежедневно съедать не менее 400 грамм овощей и фруктов;
- не курить, не злоупотреблять алкоголем.

ИНФАРКТ МИОКАРДА



при содействии РЗО
«За здоровое Забайкалье!»

ИНФАРКТ МИОКАРДА – одна из самых распространенных причин смерти и инвалидизации населения в мире.

В России ежегодно более 150 тысяч человек страдают данным заболеванием, а ещё около 40 тысяч человек переносят повторный инфаркт миокарда в течение первого года, значительно ухудшающий прогноз жизни больных.

Инфаркт чаще развивается у мужчин в возрасте от 40 до 60 лет.

У женщин это заболевание встречается примерно в полтора-два раза реже.

! Без соответствующей высокоспециализированной помощи в первые часы заболевания многие из этих людей подвергают свою жизнь смертельной опасности

СИМПТОМЫ ИНФАРКТА



инфаркт миокарда сопровождается чувством «нехватки воздуха», чувством «страха смерти»



интенсивная давящая, сжимающая, жгучая боль за грудиной;



при нагрузке или в покое боль может распространяться в шею, левую руку, плечи;

ЧТО ДЕЛАТЬ

03 НЕМЕДЛЕННО
ВЫЗВАТЬ
БРИГАДУ
СКОРОЙ
ПОМОЩИ

103
112

ДО ПРИЕЗДА ВРАЧЕЙ



1. Принять положение сидя или лёжа
2. Разжевать полтаблетки аспирина
3. Принять таблетку нитроглицерина под язык или сделать ингаляцию нитроспрея